

6. ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 8 χλμ ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου από τον παλιό παραλιακό δρόμο αμέσως μετά το αεροδρόμιο. Η εκβολή του και η μικρή ελώδης έκταση βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της αμμώδους παραλίας της Αμνισού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στην αρχαιότητα το όνομα του ξηροπόταμου Καρτερός ήταν Αμνισός. Η παραλία ήταν πρόσφορη για την ανέλκυση των πλοίων και κατάλληλο καταφύγιο για τον στόλο της Μινωικής Κρήτης όπως αναφέρει ο Στράβων. Σύμφωνα μάλιστα με τον Όμηρο στην παραλία αυτή αποβιβάστηκε ο Θησέας και ο Οδυσσεάς κατά τις περιπλανήσεις του, «*Στην Αμνισό την κακολίμανη, πλάι στις θεάς Λεχούσας το σπήλιο, εμπόδισε, το δρόλαπα μεβιάς για να γλιτώσει*», Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Στην ίδια παραλία αποβιβάστηκε με το στρατό του και ο βυζαντινός στρατηγός Καρτερός για την ανάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς. Η παλαιότερη μνεία του οικισμού αναφέρεται σε συμβόλαιο του συμβολαιογράφου από το Χάνδακα Benv. De Brixano το 1302. Επί τουρκοκρατίας το χωριό και ο ποταμός ονομαζόταν Hiyarli Dere = ποταμός των αγγουριών.

Μικρή εκβολή, ελώδεις εκτάσεις και ζώνη αμμοθινών που προσελκύουν πολλά μεταναστευτικά πουλιά. Η μικρή νησίδα της Αμνισού, οι ρηχές θαλάσσιες εκτάσεις, οι βραχώδεις ακτές στα δυτικά αλλά και η παραλία και οι γύρω γεωργικές εκτάσεις προσελκύουν επίσης πτηνά.

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΑΔΑ: Στο ποτάμι (καλαμιές) φωλιάζει η ωχροστριτίδα και στη ζώνη αμμοθινών ο ποταμοσφυριχτής και ο κατσουλιέρης. Στη μικρή νησίδα της Αμνισού η σουσουράδα και η σταχτάρα. Το χειμώνα παρατηρούνται η σταρήθρα, το χωραφοσπούργιτο, η κοκκινοκελάδα, ο κορμοράνος, ο σταχτοτσικνιάς, η λασποσκαλίδρα, η τουρλίδα και η φαλαρίδα, σπανιότερα ο μαυροπελαργός και το φοινικόπτερο. Μεταξύ των περαστικών κατά τη μετανάστευση ξεχωρίζουν: λευκοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, κρυπτοτσικνιάς, πορφυροτσικνιάς, σαρσέλα, κιτρινοσουσουράδα, μικρογαλιάνδρα, καλαμόκιρκος, τσιγλοποταμίδα, ακτίτης, λασπότρυγκας, βαλτότρυγκας, καλαμοκανάς, νανοσκαλίδρα, δρεπανοσκαλίδρα, μπεκατσίνι.


ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙΑΔΑ: Υπάρχει καλός πληθυσμός νεροχελωνών (*Mauremis rivulata*) και στην αμμουδιά φτιάχνουν φωλιές οι θαλάσσιες χελώνες (*Caretta caretta*). Αναφέρονται επίσης τα: Σπιτικό σαμιαμίθι (*Hemidactylus turcicus*), τρανόσαυρα (*Lacerta trilineata*), λιακόνη (*Chalcides ocellatus*), δεντρογαλιά (*Coluber gemonensis*), όχεντρα (*Elaphe situla*), νερόφιδο (*Natrix tessellata*), όφης (*Telescopus*

fallax), άρκαλος (*Meles meles*), καλλιγιαννού (*Mustela nivalis*), ζουρίδα (*Martes foina*), σκαντζόχοιρος (*Erinaceus concolor*), μυγαλή (*Crocidura suaveolens*), νανομυγαλή (*Suncus etruscus*), λαγός (*Lepus europaeus*), αγκαθοποντικός (*Acomys minous*), δασοποντικός (*Apodemus sylvaticus*), ποντικός (*Mus musculus*), αρουραίος (*Rattus rattus*).

ΧΛΩΡΙΔΑ: Υποβαθμισμένη υγροτοπική βλάστηση με καλαμιές, αλμυρίκια, βούρλα, και έτσι ξεχωρίζουν τα είδη ετησίων φυτών της αμμώδους ακτής.

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή η άνοιξη (Μάρτιος ως μέσα Μαΐου) αλλά και το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος). Ορισμένες χρονιές ο χειμώνας κρατάει σημαντική ποικιλία πτηνών.

Χάρτης 6. Εκβολή Καρτερού ποταμού





Εκβολή Καρτερού ποταμού



Κορμοράνοι στην ακτή